

< 带状疱疹ワクチン2種類の比較 >

* 対象年齢は50歳以上

	乾燥弱毒水痘生ワクチン「ビケン」	「シングリックス」不活化ワクチン
接種方法・回数	皮下注射・1回	筋肉注射・2回(初回接種2か月後に2回目)
带状疱疹の発症予防効果	51.3%	50歳以上 97.2% 70歳以上 89.8%
带状疱疹発症後の [°] し [°] りした痛みの予防効果	66.5%	50歳以上 100% 70歳以上 85.5%
予防効果の持続期間	5年で効果が減弱	9.6年後まで89.0%が有効
副反応 (3日~7日で消失)	かるい接種部位の痛み、腫れ、発赤	接種部位の痛み、腫れ、発赤、倦怠感、頭痛
費用	8,800円(税込)	1回20,000円 2回接種合計40,000円(税込)



長所	<ul style="list-style-type: none"> ・1回で済む ・費用が安い 	<ul style="list-style-type: none"> ・予防効果が高く、その持続期間が長い ・妊婦や免疫が低下している方も接種できる
短所	<ul style="list-style-type: none"> ・妊婦や免疫が低下している方は接種できない ・持続期間が短い 	<ul style="list-style-type: none"> ・費用が高く、2回接種が必要 ・副反応が比較的強い(接種部位の痛み 78%)